

## BOLŠEVNÍK OBROVSKÝ

Dvojiročná rastlina, dorastá až do výšky 2 – 5 metrov. Kvitne od júna do júla. Druh je aj samoopelivý, aj jedna osamotená rastlina dokáže vytvoriť semená vo veľkom množstve. Šíri sa predovšetkým semenami, ktoré dokážu v pôde prečkať roky. Na Slovensku sa vyskytuje najmä v severnejších častiach Slovenska od západu až po východ, kde sa vyskytuje najmä v okolí vodných tokov, na vlhších lúkach, okrajoch lesných porastov.

**POZOR! V šŕave v listoch a stonke rastlín sa nachádzajú látky spôsobujúce ťažké poleptania kože a vytvorenie vodnatých pľuzgierov.**

Metódy odstraňovania - Vykopávanie, kedy je potrebné odstrániť predovšetkým hlavu koreňa (minimálne do hĺbky 20 cm). Kosenie alebo mulčovanie v období pred kvitnutím druhu, aby nedošlo k vytvoreniu semien. Zásah je potrebné v priebehu roka zopakovať. Pri odstraňovaní druhu sa využíva aj postrek herbicídmi alebo sa porasty druhu najprv mechanicky odstránia a následne po opätovnom narastení rastliny sa postriekajú herbicídmi.