

POHÁNKOVEC (KRÍDLATKA)

Trváca bylina s bohato rozkonárenými podzemkami, z ktorých vyrastajú jednotlivé byle. Dorastá až do výšky 3 metrov. Kvitne v auguste až septembri. Rozmnožuje sa predovšetkým podzemkami. Rastie najmä na opustených nevyužívaných miestach s narušenou vegetáciou, v okolí vodných tokov, ciest, železníc. Často vytvára rozsiahle husté porasty, pod ktorými už nedokážu existovať žiadne iné druhy rastlín. Vyskytuje sa na celom území Slovenska.

Metódy odstraňovania - účinný je najmä postrek porastov herbicídmi – napr. ROUNDAP, v čase kvitnutia druhu. Dôležité je, aby v danom roku nebolo predtým do porastu zasahované iným (mechanickým) spôsobom. PO aplikácii herbicídu sa porast skontroluje, či celý porast po postreku zhnedol a vyschol. Ak nie, je potrebné zásah zopakovať na ostávajúce zelené časti. Potom sa vyschnutý porast ponechá cez zimu premrznúť a na jar sa odstráni uschnuté časti rastlín. Pri menších porastoch sa využíva aj vykopávanie, kosenie alebo mulčovanie v čase pred kvitnutím rastlín, pričom je potrebné opakovať zásah viackrát ročne niekoľko rokov po sebe.